



آخرین آمار مربوط به عفونت اچ آی وی در جمهوری اسلامی ایران

پایان شش ماهه اول ۱۳۹۹

بهداشت استقاده عمومی



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

نگاهی اجمالی بر آمار :

مطابق روش های آماری تخمین زده می شود که ۶۰۴۳۱ نفر در کشور مبتلا به اچ آی وی هستند . بر اساس نظام جامع مدیریت داده های الکترونیک اچ آی وی کشور، تا پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ از بین افراد مبتلا به اچ آی وی شناسائی شده، ثبت و گزارش شده، ۲۲۴۰۶ نفر زنده هستند (کل موارد ثبت شده از ابتدا تا کنون ۴۱۸۷۶ نفر بوده اند، که مرگ ۱۹۴۶۹ نفر آنها ثبت شده است). از این میان، ۱۵۶۱۸ نفر برای دریافت خدمات به مراکز ارائه دهنده خدمت مراجعه می کنند و تعداد ۱۵۲۰۰ نفر تحت درمان قرار دارند .

اگرچه ۸۲٪ کل موارد را مردان و ۱۸٪ را زنان تشکیل می دهند. اما الگوی راه انتقال و در صد ابتلای زنان و مردان در سال های اخیر تغییر کرده است به گونه ای که از کل موارد شناسایی و گزارش شده در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹، ۳۰٪ موارد ثبت را زنان و ۷۰٪ آنها را مردان تشکیل می دهند .

۵۰٪ از کل موارد شناخته شده در زمان تشخیص ، در گروه سنی ۲۰ تا ۳۵ بوده اند و ۷۶٪ از کل موارد شناخته شده در زمان تشخیص ، در گروه سنی ۲۰ تا ۴۵ بوده اند که الگوی انتقال سنی در سال های اخیر تغییری نکرده است .

علل ابتلا به اچ آی وی در بین کل مواردیکه از سال ۱۳۶۵ تا کنون در کشور به ثبت رسیده اند به ترتیب، تزریق با وسایل مشترک در مصرف کنندگان مواد (۵۹،۲در صد)، رابطه جنسی (۲۳ در صد) و انتقال از مادر به کودک (۱،۷ در صد) بوده است. راه انتقال در ۱۶٪ از این گروه نامشخص مانده است. لازم به ذکر است که راه انتقال ۰،۲ در صد از این موارد مربوط به خون و فرآورده های خونی در سال های پیش از اجرای سیاست پالایش صد در صدی خون سالم توسط سازمان انتقال خون می باشد. این در حالی است که در بین مواردی که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ تشخیص داده شده اند راه احتمالی انتقال در ۲۲،۸٪ موارد اعتیاد تزریقی، ۵۰،۹٪ روابط جنسی ؛ ۱،۵٪ مادر به کودک و ۲۴،۸٪ راه احتمالی ابتلا بیان نشده است . ضمناً هیچ مورد ابتلا جدیدی از طریق خون و فرآورده های خونی ثبت نشده است.